

Dr n. med. Małgorzata Idzior-Haufa, Lek. dent. Izabela Maćkowiak, Prof. Agata Czajka-Jakubowska

Rehabilitacja protetyczna pacjentów po resekcji środkowego piętra twarzy z zastosowaniem różnych rodzajów obturatorów.

Wstęp:

Pacjenci po zakończonym leczeniu z powodu raka kości szczęki i podniebienia wymagają rehabilitacji protetycznej. Komunikacja jamy ustnej z jamą nosową powoduje znaczne trudności w mowie i połykaniu.

Cel:

Przedstawienie rehabilitacji protetycznej u pacjentów bezzębnych po częściowej resekcji szczęki z zastosowaniem protez całkowitych z różnymi rodzajami obturatorów.

Omówienie:

W pracy omówiono proces rehabilitacji dwóch pacjentów, którzy zgłosili się do Poradni Rehabilitacji Narządu Żucia po resekcji szczęki. Pierwszy pacjent, z rozległą komunikacją z jamą nosową, zgłosił się z powodu trudności w użytkowaniu dotychczasowej protezy całkowitej szczęki z obturatorem pełnym wykonanym z Molloplastu. Wykonano nową protezę, o zmniejszonym zasięgu, z obturatorem otwartym, uszczelnionym materiałem Ufi Gel. U drugiego pacjenta, z rozległym połączeniem z jamą nosową, częściowo zamkniętym przeszczepem skóry z przedramienia, wykonano protezę z obturatorem pustym, zamkniętym, akrylowym, uszczelnionym materiałem Ufi Gel.

Podsumowanie:

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protez z obturatorem poprawia ich utrzymanie i pozytywnie wpływa na funkcje mowy oraz połykania.