

Dr n. med. Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Prof. Elżbieta Paszyńska, Dr n. med. Hanna Maria Winiarska, Dr n. med. Daria Springer, Prof. Szczeoan Cofta

Potrzeby rehabilitacji stomatologicznej u dorosłych pacjentów z mukowiscydozą

Cel pracy. Celem projektu była ocena stanu zdrowia jamy ustnej oraz potrzeb leczniczych w zakresie jamy ustnej u dorosłych pacjentów z mukowiscydozą.

Material i metoda. Do badania włączono 60 pacjentów z mukowiscydozą w wieku od 18 do 49 lat. Przeprowadzono kompleksowe badanie wewnątrzustne za pomocą zestawu instrumentów diagnostycznych z oceną wielu zmiennych określających retencję płytki nazębnej, stan zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz ilość utraconych zębów.

Wyniki. Klinicznie najczęściej obserwowano utratę tkanek twardych zębów z powodu choroby próchnicowej (u 58% pacjentów) oraz periodontopatie (48%). Potrzeby leczenia protetycznego występowały u 50%, a ortodontycznego u 40% pacjentów; znacznie mniej badanych wymagało leczenia chirurgicznego (6%). Braki w uzębieniu, najczęściej jednego lub dwóch zębów, stwierdzono u 42,3% badanych.

Wnioski. Chorzy z mukowiscydozą nie są już wyłącznie lub w większości pacjentami pediatrycznymi, ale wymagają leczenia wielospecjalistycznego, również stomatologicznego, w tym działań profilaktycznych, w celu uniknięcia powikłań w jamie ustnej. Istnieje potrzeba dalszych badań ekosystemu jamy ustnej z udziałem dorosłych pacjentów z mukowiscydozą.